

La pandémie de SIDA et les enfants

Décès dus au SIDA :

- Toutes les minutes, chaque jour, un enfant de moins de 15 ans meurt à cause du SIDA.
- Le SIDA a fait trois millions de victimes en 2004. Une sur six était un enfant de moins de 15 ans.
- En 2004, 510 000 enfants de moins de 15 ans sont morts à cause du SIDA.

L'infection à VIH chez les enfants et les jeunes :

- Chaque année, 640 000 enfants de moins de 15 ans contractent le VIH. Faute d'un traitement, la moitié d'entre eux mourront avant leur deuxième anniversaire.
- Près de 90 pour cent des enfants nouvellement infectés vivent en Afrique subsaharienne, mais le nombre de ces infections augmente dans d'autres régions, notamment en Asie.
- Toutes les 15 secondes, un jeune qui a entre 15 et 24 ans contracte le VIH.
- En 2004, plus de 2 millions de jeunes entre 15 et 24 ans ont été infectés par le VIH.

Transmission de la mère à l'enfant :

- En très grande majorité, les enfants de moins de 15 ans séropositifs ont contracté le virus par le biais de leur mère. Mais moins de 10 pour cent des femmes enceintes reçoivent les services qui leur permettraient d'éviter de transmettre le VIH à leur bébé.
- Faute de soins préventifs, environ un tiers des bébés nés de mères séropositives seront contaminés durant la grossesse, le travail, l'accouchement ou l'allaitement au sein.

Traitements pédiatriques :

- Un médicament commun, le cotrimoxazole, peut réduire de près de moitié le nombre de décès d'enfants dus au VIH/SIDA. Ce traitement ne coûte que trois *cents* (d'un dollar E.-U.) par jour. Mais seulement 1 pour cent des enfants qui en ont besoin le reçoivent.
- 4 millions d'enfants, dont certains ont déjà été déclarés séropositifs et d'autres, nés de mères séropositives, n'ont pas encore été diagnostiqués, auraient besoin de cotrimoxazole, un médicament qui s'est avéré efficace pour lutter contre des maladies mortelles.
- Près de 660 000 enfants de moins de 15 ans ont besoin de recevoir un traitement antirétroviral.

- Moins de 5 pour cent des enfants séropositifs qui ont besoin d'un traitement antirétroviral le reçoivent.

Orphelins et enfants vulnérables :

- On estime qu'en 2010, plus de 18 millions d'enfants – plus que tous les enfants vivant au Royaume-Uni, auront perdu au moins un de leurs parents à cause du SIDA dans la seule région de l'Afrique subsaharienne.
- Moins de 10 pour cent des enfants rendus orphelins ou vulnérables par le SIDA reçoivent une aide de l'État, sous une forme ou une autre.

Prévention:

- La vaste majorité des jeunes n'ont pas accès aux informations, aux compétences et aux services essentiels pour prévenir le VIH/SIDA.